


Ecrit par Echo du Mardi le 3 décembre 2020

## Covid-19 : les principaux facteurs de comorbidité

## Covid-19 : les principaux facteurs de comorbidité

Types de comorbidité les plus courants chez les personnes décédées du Covid-19 en France \*



\* Période : du 1er mars au 15 novembre 2020.

Base: personnes présentant au moins une comorbidité (65 % des décès)

Sources : Santé publique France, INSERM











3 novembre 2025 | Covid-19 : les principaux facteurs de comorbidité



Ecrit par Echo du Mardi le 3 décembre 2020

Trois catégories de population prioritaires sont déjà identifiées : les professionnels de santé au contact direct des patients et ceux les plus à risque de développer les formes graves de la maladie, comme les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Le graphique de <u>Statista</u> fait le point sur cette dernière catégorie de la population, en présentant les principaux facteurs de comorbidité identifiés chez les personnes décédées depuis le début de l'épidémie. Selon <u>l'analyse</u> réalisée par Santé publique France et l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), 65 % des patients décédés du 1er mars au 15 novembre présentaient au moins une comorbidité, les plus fréquentes étant les pathologies cardiaques (34 %), l'hypertension artérielle (23 %) et le diabète (16 %).

**De Tristan Gaudiaut pour <u>Statista</u>**